

好光景[®] Alert[®]

吊絲蟲、薊馬、蟎類專用

(克凡派) 10% 水懸劑

產品特性

1. 優異之胃毒及觸殺作用。
2. 具有滲透移行性。
3. 無交叉抗性。
4. 與其它核准藥劑作用機制不同，具速效與殘效性。



產品規格：
200毫升 膠瓶
500毫升 膠瓶

對害蟲的作用機制

好光景屬於Pyrrole類殺蟲劑，作用點在害蟲粒線體內。好光景會在害蟲細胞內先轉變成活性化的物質，再結合於粒腺體內，產生磷酸氧化作用，將ADP轉化成ATP所需的氫離子消耗掉，以致害蟲永遠無法生產ATP，細胞停止作用，而致死亡。

環境安全性

- 在土壤中不具移動性。
- 低水溶解性。
- 土壤中，易被好氣菌分解代謝。

使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
十字花科 蔬菜	小菜蛾	1.0公升	1000	害蟲發生時每隔7天施藥一次。	1. 小葉菜類採收前10天停止施藥。 2. 包葉菜類停止採收前14天停止施藥。
番茄	番茄夜蛾	1.0-1.5公升	1000	害蟲發生時每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
洋香瓜	南黃薊馬	1.0-1.5公升	1000		採收前6天停止施藥。
蓮霧	腹鉤薊馬	0.6-2.0公升	1500	薊馬發生時施藥一次。	採收前12天停止施藥。
梨	二點葉蟬	0.5-0.7公升	2000	葉蟬密度每葉達5隻以上(含各齡期)以上時，施藥一次隔10天再施藥一次。	採收前15天停止施藥。
豌豆	甜菜夜蛾	0.5-1.0公升	1000	害蟲發生時每隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
茶	神澤氏葉蟬、葉蟬類	1.0公升	1000	害蟲發生時開始施藥。	採收前21天停止施藥。
茼蒿、菠菜、 小葉菜類	夜蛾類	0.8-1.0公升	1000	害蟲發生時每隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。 小葉菜類公告標示外使用。
胡蘿蔔					採收前3天停止施藥。
葡萄	夜蛾類	1.0-1.2公升	1000	結果期蟲害發生初期開始施藥，以後隔10天施藥一次。	採收前30天停止施藥。
山藥	黑盲椿象	0.8~1.0公升	1500	害蟲發生時，開始施藥，每隔7天施藥一次，最多施藥兩次。	採收前6天停止施藥。
檬果	薊馬類	1.5-2.0公升	1000	薊馬發生初期每隔7天施藥一次，最多施藥兩次。	採收前12天停止施藥。
印度棗、紅棗	薊馬類	0.5-0.8公升	1500	害蟲發生時，開始施藥，必要時隔7天施藥1次。	採收前15天停止施藥。
李、梨		0.7-1.3公升			
梅		0.8-1.2公升			
柿		0.7-1公升			
枇杷		1-1.3公升			
印度棗、紅棗	葉蟬類	0.4-0.6公升	2000	害蟬發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥1次。	採收前15天停止施藥。
枇杷		0.8-1.0公升			
桃		0.5-1.0公升			
梅		0.6-0.9公升			



使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
豆薯	夜蛾類 螟蛾類 毒蛾類	0.5-0.8公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前3天停止施藥
韭菜	薊馬類	0.8-1.0公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥一次，共三次。	採收前9天停止施藥。
番石榴	薊馬類	0.8-1.3公升	1500	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前12天停止施藥。
楊桃	薊馬類	0.5-1.1公升	1500	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前12天停止施藥。
蘋果	葉蟬類	0.5-0.6公升	2000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前15天停止施藥。
豆科豆菜類	夜蛾類 螟蛾類 毒蛾類	0.5-0.8公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	豆菜類(毛豆除外)採收前 18天停止施藥。
柑桔類	薊馬類	1-2.4公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前7天停止施藥。
小葉類	鱗翅目害蟲	0.8-1.0公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前10天停止施藥。
茄科作物 根菜類	夜蛾類	0.5-1.5公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前3天停止施藥。
茄科 果菜類	夜蛾類	0.5-1.5公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前9天停止施藥。
觀賞花卉	夜蛾類	0.6-2.5公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	使用前宜先進行小面積要 害測試。
	薊馬類				
茄科 小葉菜類	夜蛾類	0.5-1.5公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前10天停止施藥。
茉莉	薊馬類	0.6-2.5公升	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時 每隔7天施藥1次。	採收前6天停止施藥。