

# 草霸王<sup>®</sup> Basagran<sup>®</sup>

選擇性萌後除草劑

(本達隆) 44.1% 溶液

## 產品特性

1. 對闊葉雜草如野苾菰、鴨舌草、螢蘭、瓜皮草、木蝨草，莎草科等有效。
2. 屬於選擇性殺草劑。



產品規格：  
500毫升 膠瓶  
1000毫升 膠瓶

## 對雜草的作用機制

草霸王屬於Thiadiazine系化合物，為接觸型萌後處理劑、藥劑可經由葉部吸收，亦可由根部吸收後經木質部由下往上迅速移行。其作用機制為干擾光合作用中的電子傳遞鏈，使二氧化碳之同化作用無法進行，導致雜草生長遲滯而死亡。

## 使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
秧田	濕田 直播雜草	3公升	200	播種後	播種前2天蓋平田面濁水狀時施用13%殺滅丹粒劑或10%殺丹粒劑或5%丁基拉草粒20KG保持3-5CM積水，播種時排水，播後30天前排乾積水施藥。
秧田	雜草	3公升	200	插秧前	秧田移植前第1期作11天第2作5天時施藥並保持排水狀3-5天；如稈草多時於秧苗1葉時排乾積水施用35%除草靈EC，25L/HA，施藥後排水3-5天。
秧田	中間作 直播田雜草	3公升	200	播種後	播種後7-10天保持3CM水深先用13%殺滅丹粒劑或5%丁基拉草粒劑20KG再於播種後30天排水施本劑，積水3-5天。稈草少時於30天前排乾施藥。

## 使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
移植本田	雜草	3公升	200	生長中期時 施用	第1期作插秧後30-40天，2期作20-30天施藥。施藥前1天排乾積水後噴於草上，2-5天後灌水。生長初期先用一般殺草劑以達安全殺草效果。
移植本田	雜草	1.5-2.0公升	稀釋水量30L	插秧後	中期處理：1期作插秧後20-40天；2期作20-30天施藥，於前1天排乾積水時施於草上；須用特製控制粒子噴霧器(CDA法)。無風或微風時噴施，人行方向與風向成直角，距離水稻9-10公分高，左右搖動約五公尺；應選用每秒流量2公撮之噴嘴，每分鐘走約16-18公尺之步速每分地(0.1公頃)約需26-28分鐘。