

圃地善[®] Butisan S[®]

旱田萌前除草劑

(滅草胺) 43.1% 水懸劑

產品特性

1. 施藥時間彈性大：定植前萌前與定植後至雜草2~4葉期施藥均可。
2. 殘效期長。
3. 殺草範圍廣：可防止一年生禾本科雜草及大多數闊葉雜草。
4. 混合性：混合性良好，可混合其他雜草劑，但不可任意與液體肥料混用。



產品規格：
250毫升 膠瓶

對雜草的作用機制

本劑會干擾雜草脂肪酸之合成，可有效的防除萌前或早期萌後2-4葉期內之雜草。有效成分主要由根部吸收。

對作物的解毒機制

圃地善對移植的甘藍菜作物具高選擇性，主要是本劑可與作物中「穀胱甘肽」(Glutathione)迅速接合(Conjugation)而達到解毒目的。

國內登記使用範圍及方法

作物	每公頃施用量	稀釋方法	施藥時期及方法	防治對象
甘藍田雜草	1.5公升	600公升	定植後雜草萌芽前(萌前處理)均勻施用。	
甘薯田雜草	1公升	600倍	插植後的第一天均勻噴施於畦面。	龍葵、小藜(適合秋作及塊根用品)。
非耕作農地 小花蔓澤蘭	1.5公升	600公升	萌芽前均勻噴施於土面。	