農藥廣告字第105077號　農藥進字第01805號

斯統普® Stomp®

旱田雜草萌前除草劑

(施得圃) 34% 乳劑

產品規格：
1000毫升 膠瓶

產品特性

1. 防治一年生闊葉雜草與禾本科雜草。
2. 除抑制雜草種子萌芽外，亦能抑制雜草幼苗的生長。
3. 揮發性低，且其分子結構能與土壤團粒緊緊吸附在一起，除在土壤中不易流失外，亦能減少因烈日曝曬引起的分解、揮發。

對雜草的作用機制

斯統普能抑制雜草芽尖及根尖分生組織的細胞分裂，亦即植物在進行有絲分裂時，使其染色體於複製後無法沿著紡錘絲向兩極分開，導致細胞分裂受阻而停止生長。

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	施藥方法	注意事項
大豆園	雜草	2.5公升	240		整地耙平後，將藥劑全面均勻噴於土壤表面，並與土壤混合後開始播種。	
大豆園	雜草	3-4.5公升	350	播種後	整地播種後全面噴於土壤表面。	
甘藍園	雜草	2公升	500	定植前	定植前一天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。	土壤表面濕潤後施藥。
洋蔥園	雜草	2.5公升	400	定植後	定植後2-4天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝兩道。	土壤表面濕潤後施藥。
番茄園	雜草	2.5公升	240	雜草萌芽後	定植第一次培土後俟雜草1-2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。	避免噴及作物之生長點。

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	施藥方法	注意事項
紅豆園	雜草	5-6公升	180-200	播種覆土後，雜草萌芽前	全面噴施於土壤表面。	1. 播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。2. 防除對象：牛筋草、旱辣蓼、龍葵、野莧、小葉灰藜、滿天星。
菸草	腋芽抑制	3.2公升	166			1. 於菸草摘蕊後，將藥劑噴於莖頂，每株30公撮，使沿莖頂留下，間隔7-10天配合21.7%抑芽素(鉀鹽)溶液施用，每株20公撮均勻噴於上部葉面上。2. 21.7%抑芽素(鉀鹽)溶液使用倍數48倍。每公頃使用量7.5公升。3. 發蕾前避免施藥以免發生藥害。4. 安全採收期18天。
菸草	腋芽抑制	12公升	30			1. 菸草始花期摘芯後可一次施用，如分兩次施用，時間應間隔7-10天，藥量各減半，或與抑芽素(鉀鹽)溶液配合施用，藥量各減半，每株用20公撮，噴於莖桿頂端，使藥液流入葉腋。2. 應加0.1%之展著劑。
菸草	腋芽抑制	5.4公升	100	菸草摘蕊後	菸草摘蕊後，將藥噴於莖頂，每株三十公撮使沿莖頂流下。	發蕾以前避免施藥，以免發生藥害。安全採收期18天。
菸草園	雜草	3-4.5公升	稀釋水量400L	雜草萌芽後	定植培土後，土壤濕潤時以帶狀畦面噴施。	避免噴到生長點。
菸草園	雜草	1.6-3.2公升	稀釋水量600L		培土7-10天灌水後雜草初期萌芽時，帶狀畦面噴施(萌後處理)。	避免噴到生長點。
落花生園	雜草	5-6公升	180-200	雜草萌芽前	播種覆土後，雜草萌芽前全面噴於土面。	
蒜園	雜草	3.5公升	180	雜草萌芽後	栽植後畦田禾本科雜草萌發至1-2葉時，將藥劑均勻全面噴施。	施藥時田間應保持濕潤狀態。
豌豆園	雜草	3.5公升+24%巴拉刈3.3公升	150	播種覆土後	播種覆土後，均勻噴施於土壤表面。	1. 限於冬季裏作不整地栽培時使用。2. 兩種藥劑立即混合使用。
蘿蔔園	雜草	1.5-2公升	500	播種後	播種後均勻噴射於畦面。	
甘藷園	雜草	2公升	300	播植後第一天均勻噴施於畦面。	播植後第一天均勻噴施於畦面。	
金針園	雜草	3.5公升	180	雜草萌發至1-2葉時均勻噴施。。	施藥時田間應保持濕潤狀態。	

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	施藥方法	注意事項
白菜園	雜草	1.5-2公升	750-1000	播種後	播種後均勻噴施於畦面。	1.施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2.防除對象：牛筋草、小葉灰藜、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。
油菜園						
芹菜園						
芥菜園						
芥藍園						
青江白菜園						
扁蒲園						
胡瓜園						
苦瓜園						
茼蒿園						
莧菜園						
絲瓜園						
萵苣園						
菠菜園						
蕹菜園						
韭菜園	雜草	3.5公升	600	畦面雜草萌芽至1～2葉時	畦面雜草萌芽至1～2葉時將藥劑均勻全面噴施。	1.施藥後田間應保持濕潤狀態。 2.防除對象：鵝兒腸、小葉灰藜、牛筋草、節節花、滿天星、野莧、龍葵、馬齒莧。
枸杞園	雜草	2.5公升	600	定植第一次時	定植第一次培土後雜草1～2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。	1.避免噴及作物之生長點。 2.防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藜、馬齒莧、龍葵、野莧。
香瓜茄						
甜椒園						
辣椒園						
酸漿園						
樹番茄園						
結球白菜園	雜草	2公升	1000	定植前1天	定植前1天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。	1.土壤表面濕潤後施藥。 2.防除對象：小葉灰藜、牛筋草、野莧、馬齒莧、珠仔草。
結球萵苣園						
萊豆園	雜草	3-4.5公升	1000-1500	整地播種後	整地播種後全面噴施於土壤表面。	1.施藥時田間應保持濕潤狀態。 2.防除對象：牛筋草、大指草、小指草、旱辣蓼、山芥菜、野莧。