農藥進字第02319號　農藥廣告字第105080號

威力旺® Cantus®

白粉病、灰黴病用藥

(白克列) 50% 水分散性粒劑

產品特性

1. 適用範圍廣泛。
2. 傳統的系統移行性。
3. 耐雨性佳。
4. 具極佳保護作用及初期治療效果。
5. 適合病害綜合防治使用。

產品規格：
100公克 鋁箔袋
250公克 鋁箔袋

對病原菌的作用機制

- 威力旺屬於苯甲醯胺類(Anilide)之新型殺菌劑，具極佳保護作用及初期治療效果。此類藥劑之作用機制乃是透過阻斷病原菌之呼吸作用，有效抑制孢子發芽、發芽管生長及吸附器之形成，對少部分病原真菌，具有抑制菌絲生長及孢子形成的效用。。
- 威力旺主要作用點為抑制粒線體內膜上電子傳遞鏈中的複合物II琥珀去氫酶的作用，導致能量的產生極受阻，氨基酸及脂質的合成被阻斷，進而瓦解病菌的生長。

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
瓜類	白粉病	0.5公斤	2500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	小黃瓜採收前6天停止施藥，其他瓜類採收前12天停止施藥。
胡瓜	白粉病	0.5公斤	2500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	1. 胡瓜:採收前12天停止施藥 2. 小黃瓜:採收前6天停止施藥。
紅豆	白粉病	0.2-0.3公斤	2500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	103年政府公告延伸使用。安全採收期為21天。

台灣巴斯夫公司股份有限公司

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
草莓	灰黴病	0.75公斤	1500	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續4次。	採收前5天停止施藥。
印度棗	白粉病		2500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續4次。	採收前21天停止施藥。
豌豆	白粉病	0.4公斤	2500	發病初期開始施藥，必要時每隔7天施藥一次，連續3次。	採收前9天停止施藥。
葫蘆科 瓜菜類	白粉病	0.5公斤	2500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	採收前6天停止施藥。
玫瑰	白粉病	0.4公斤	2500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	
草莓	白粉病	0.75公斤	1500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次。	1.安全採收期5天。 2. 具呼吸中等毒性。
豆科豆菜類	白粉病	0.2-0.3公斤	2500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥
	白粉病	0.4公斤	2500	發病初期開始施藥，每隔 7天施藥一次，共3次。	採收前9天停止施藥。 1.禁止使用於豆苗。2.豆科豆菜類作物包括：大豆（毛豆）、豌豆、菜豆、豇豆、萊豆、蠶豆、扁豆、翼豆等。
豆薯	白粉病	0.2-0.3公斤	2500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥
胡麻	白粉病	0.2-0.5公斤	2500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	103年政府公告延伸使用。安全採收期為21天。
茄科果菜類	白粉病	0.2-0.6公斤	2500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。