農藥廣告字第105096號　農藥進字第02583號

祥威豐® Pristine®

混合殺菌劑

(白列克敏) 38% 水分散性粒劑

產品規格：
150公克 鋁箔袋
250公克 鋁箔袋
500公克 鋁箔袋
(專案出貨)

產品特性

1. 混合二種殺菌劑，殺菌範圍廣。
2. 雙重作用點的作用機制，殺菌效果更佳。
3. 具有系統移行及穿透葉片組織的能力，作用迅速、殘效性長。
4. 兼具預防及治療效果，對作物提供全方位的保護；適合病害綜合防治使用。
5. 藥劑的混合性及耐雨性極佳。

對病原菌的作用機制

祥威豐是一具有保護、治療效果的殺菌劑。除了能抑制孢子發芽及發芽管的生長之外，更可有效終止病原菌菌絲生長及孢子的形成。其雙重作用點為阻斷病原菌粒線體電子傳遞複合物II號琥珀酸脱氫酶及複合物III細胞酵素bc1作用，進而影響細胞正常代謝作用，作後致使病原菌衰竭死亡。

在植物體內的傳導

- 祥威豐噴佈於葉表之後，其有效成分親脂性的部份會被葉片上的臘質穩穩吸附，因此不易被雨水沖刷。又本藥劑對水的溶解度極低，使得其有效成分可緩緩被釋出，讓藥劑得以延長。
- 附著於葉表上的藥劑會逐漸向四方擴散，並經由氣孔迅速進入葉肉組織，進而移行至葉背或隨著水流方向移行至葉片頂端，對病原菌的侵入或危害形成強而有力的保護。

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
木瓜	炭疽病 褐斑病		1500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續4次。	安全採收期12天。 木瓜褐斑病僅限於緊急防治使用。
豆科豆菜類	銹病	0.6公斤	1500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續4次。	1. 安全採收期9天。 2. 禁止使用於豆苗。 3. 豆科豆菜類作物包括：大豆（毛豆）、豌豆、菜豆、豇豆、萊豆、蠶豆、扁豆、翼豆等。
柿	炭疽病		1500	於幼果期開始施藥，每隔10-14天施藥一次，連續3-4次。	安全採收期6天。
桃 梅	黑星病	0.7-1.3公斤 0.8-1.2公斤	1500	發病初期開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	安全採收期15天。
梨	黑星病	0.7-1.3公斤	1500	發病初期開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	安全採收期15天。
葡萄	晚腐病		1200	開花盛期開始施藥，每隔7-10天施藥一次，連續6-7次。	1. 安全採收期18天。 2. 成品呼吸中等毒。 3. 對水生物劇毒。 4. 建議加註魚毒警告標。 5. 勿使用於飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區、自來水水源水質保護區。
蓮霧	果腐病		1500	開花盛期開始施藥，每隔7天施藥一次，至套袋為止。	安全採收期21天。
蘋果	黑星病	0.6-0.8公斤	1500	發病初期開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	安全採收期15天。
瓜果類	蔓枯病	0.65-0.8公斤	1500	病害發生初期開始施藥，每7天施藥一次，連續4次。	採收前9天停止施藥。 加強瓜蔓地際部之藥劑噴施。
鼠李科梨果類（印度棗、棗）	白粉病		1500	結果初期施藥，每10天施藥一次，連續3-4次。	採收前15天停止施藥。
花木	銹病	0.4-1.7公斤	1500	病害發生初期開始施藥，每10天施藥一次。	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。