農藥廣告字第105093號　農藥進字第02445號

總發® Cabrio Team®

露菌病、疫病專用

(達滅克敏) 18.7% 水分散性粒劑

產品規格：
150公克 鋁箔袋
250公克 鋁箔袋

產品特性

1. 系統性殺菌劑，速效、持久，甭驚雨水期。
2. 雙重作用機制，不易產生抗藥性。
3. 具特殊綠化效果，增加同化作用的發生，提高作物產量與品質。
4. 溶解性及懸浮性佳。

對病原菌的作用機制

總發為新型混合殺菌劑，結合「百克敏」與「達滅芬」對病原菌的不同作用機制，可同時抑制病原菌呼吸作用及細胞壁、磷脂質生合成，增進其對病原菌的保護及治療效果。除適用範圍更廣泛外，更能有效抑制病原菌菌絲生長、孢子發芽、發芽管形成及產孢，對作物提供更優質的防護。

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
十字花科蔬菜	露菌病	0.66-0.8公斤	1500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	安全採收期9天。
瓜類	露菌病	1公斤	1000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	1. 安全採收期12天。 2. 本藥劑使用範圍：瓜類露菌病（胡瓜除外）。
馬鈴薯	晚疫病	0.5-2公斤	1000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次。	安全採收期7天。
無花果	白腐病	0.8-1.6公斤	1000	發病初期開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	安全採收期15天。

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
番石榴	疫病	1.2-2.0公斤	1000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，至套袋為止	安全採收期15天。
番茄	晚疫病	1公斤	1000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次。	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥。
菠菜	露菌病	0.2-0.7公斤	1500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	安全採收期9天。
菊科葉菜類	疫病	0.3-1公斤	1000	發病初期開始施藥。	1. 必要時隔7天施藥一次。 2. 小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）、包葉菜類採收前15天停止施藥。
菊科蔬菜	露菌病	0.2-0.7公斤	1500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	安全採收期9天。
葡萄	露菌病	1-1.2公斤	1000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次。	安全採收期15天。
蓮霧	疫病	1.2-1.5公斤	1000	開花盛期開始施藥，每隔7天施藥一次，至套袋為止。	安全採收期15天。
芋頭	疫病	0.8-1.2公斤	1000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	安全採收期7天。
薑	疫病	0.9-1.2公斤	1000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	安全採收期為7天。
菊	露菌病	0.2-0.8公斤	1500	病害發生初期開始施藥，每7天施藥一次。	採收前28天停止施藥。限花苞形成前使用。
	疫病	0.3-1.2公斤	1000	病害發生初期開始施藥，每7天施藥一次。	採收前28天停止施藥。限花苞形成前使用。
草莓	果腐病	0.8-2公斤	1000	病害發生初期開始施藥，每7天施藥一次。	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
豌豆、葉用豌豆	露菌病	0.3-0.5公斤	1500	病害發生初期開始施藥，每7天施藥一次。	採收前9停止施藥。
花木	銹病	0.4-1.7公斤	1500	病害發生初期開始施藥，每7天施藥一次。	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。