



臺灣巴斯夫股份有限公司

台北市松江路87號16樓
TEL: 02-25068131

全期晚疫病要防治

晚疫病小心，巴斯夫最用心



總發，速效又持久



達滅克敏農藥准字第02445號

全期疫病要防治

疫病要用果瓜靈



系統移行防護罩，
保護治療一把罩



達滅脫定農藥准字第02943號

春風吹又生，草籽是重點

防治雜草，巴斯夫最用心



百試達，原廠配
方，不飄散



固殺草農藥准字第02119號



金斯統普，雨季
控籽一把罩



施得圃農藥准字第02242號

農藥廣告字第000000號
免得克敏 農藥准字第03304號
達滅芬 農藥准字第02967號
達滅芬 農藥准字第02807號
克收欣 農藥准字第01814號
克收欣 農藥准字第01813號



巴斯夫 高品質番茄 生產手冊



低溫高濕時，日夜溫差大， 灰黴病易發生

灰黴病煩惱多，巴斯夫好藥乎你免操煩



美粒旺，葉片
青翠攔速效



氟殺克農藥進字第03117號

高溫高濕時，早疫病易發生



真幸福，葉片
青翠不打圈



氟殺克農藥進字第03192號

夜蛾晚上偷偷來，收成真煩惱

夜蛾危害真操煩，巴斯夫保護收成佳



使用去蟲能，
夜蛾尚介靈



美氟綜農藥進字第02636號

薊馬作夥來，收成真煩惱

薊馬防治用好光景，巴斯夫最用心



番茄用好光景，
收成好光景



克凡派農藥進字第01793號



巴斯夫高品質番茄生產防治曆

生育週期					
生育日數	0天	0~20天	20~35天	35~80天	80~140天
萌前雜草	金斯統普300倍 ¹				
萌後雜草	百試達200倍				
晚疫病			總抗病900倍(6天) ⁵ 、總發1000倍(6天) ⁵		祥發4000倍(6天) ⁵ 、雄麻嘉 ⁴ 4000倍(6天) ⁵
疫病			總抗病900倍(6天) ⁵		果瓜靈1000倍(6天) ⁶ 、祥發 ³ 4000倍(6天) ⁶ 、雄麻嘉4000倍(6天) ⁶
灰黴病			美粒旺2400倍(6天) ⁵		
早疫病			真幸福8000倍(6天) ⁵		
白粉病			好運到3000倍(7天) ⁵ 、巴斯丹精2500倍(7天) ⁵		
夜蛾類			去蟲能1000倍(3天) ⁵ 、好光景1000倍(9天) ⁵		
薊馬類			好光景 ² 1000倍(9天) ⁵		

1. 番茄雜草每公頃用藥量 2 公升，稀釋倍數 300 倍，定植第一次培土後雜草 1-2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。避免噴及作物之生長點
 2. 茄科果菜類薊馬發生時開始施藥，每公頃用藥量 0.5-1.5 公升，稀釋倍數 1000 倍，必要時每隔 7 天施藥 1 次，安全採收期 9 天
 3. 茄科果菜類疫病發生初期開始施藥，每公頃用藥量 0.1-0.4 公升，稀釋倍數 4000 倍，必要時每隔 7 天施藥 1 次，安全採收期 6 天

4. 番茄晚疫病發生初期開始施藥，每公頃用藥量 0.25 公升，稀釋倍數 4000 倍，必要時每隔 7 天施藥 1 次，連續 4 次，安全採收期 6 天
 5. 安全採收期
 6. 安全採收期 6 天，設施栽培 12 天