

# 福得寶<sup>®</sup> Delan<sup>®</sup>

保護型殺菌劑

(脞硫醌) 70% 水分散性粒劑

## 產品特性

1. 接觸性藥劑，針對多種真菌病害具有保護及初期治療效果。
2. 殘效性長。施藥後，有效成分會隨著植株嫩梢生長而擴展，使植株免受病菌危害。遇雨露濕潤，其有效成分可再溶出，再次發揮保護效果。
3. 耐雨性強。因有效成分具有優良附著性，可緊附於作物表面。



產品規格：  
500公克 鋁箔袋

## 對病原菌的作用機制

福得寶屬於醌系(Anthraquinone)殺菌劑。其作用機制為抑制病菌孢子的發芽，並阻止發芽管的生長。為一接觸型殺菌劑，對植物真菌性病害中的子囊菌、擔子菌及不完全菌，具有優越的預防及初期治療的效果。

## 使用範圍

| 作物    | 使用範圍 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數 | 施藥時機                         | 注意事項  |
|-------|------|-------------|------|------------------------------|---|
| 山藥    | 炭疽病  | 0.67公斤      | 1500 | 病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次，最多4次。  | 採收前6天停止施藥。                                      |
| 茄科果菜類 | 炭疽病  | 0.25-0.74公斤 | 2000 | 病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次。       | 採收前4天停止施藥。                                      |
| 甜椒    | 炭疽病  | 0.39-0.60公斤 | 2000 | 病害發生初期開始施藥。必要時隔10天施藥1次，最多3次。 | 因甜椒果面光滑，須加展著劑。採收前4天停止施藥。                        |
| 榛果    | 炭疽病  | 0.48-0.6公斤  | 2000 | 開花初期每7天及結果後施藥。               | 結果後每14天1次連續4次，連續陰雨施藥間隔縮。加展著劑強透力4000倍。採收前6天停止施藥。 |

## 使用範圍

| 作物  | 使用範圍  | 每公頃<br>每次用量 | 稀釋倍數 | 施藥時機                           | 注意事項  |
|-----|-------|-------------|------|--------------------------------|---|
| 金針  | 炭疽病   | 0.39-0.60公斤 | 2000 | 病害發生初期開始施藥。必要時隔10天施藥1次，最多3次。   | 1.易發生藥害，勿任意提高濃度或與其他藥劑混合使用。<br>2.須加展著劑，以增強藥效。適用於金針花。採收前4天停止施藥。 |
| 瓜菜類 | 炭疽病   | 0.39-0.60公斤 | 2000 | 病害發生初期開始施藥。必要時隔10天施藥1次，最多3次。   | 易發生藥害。<br>採收前7天停止施藥。  |
| 葡萄  | 晚腐病   | 0.42-0.78公斤 | 2000 | 開花初期施藥。必要時隔7天施藥1次。             | 施藥至套袋前為止。<br>採收前9天停止施藥。                                       |
| 楊桃  | 炭疽病   |             |      |                                |   |
| 蓮霧  | 炭疽病   | 0.48-1.5公斤  | 2000 | 開花初期施藥。必要時隔7天施藥1次。             | 施藥至套袋前為止。<br>採收前9天停止施藥。                                       |
| 番石榴 |       | 0.6-1公斤     |      |                                |   |
| 無花果 | 炭疽病   | 0.42-0.78公斤 | 2000 | 小果期施藥。<br>必要時隔7天施藥1次。          | 採收前9天停止施藥。  |
| 荔枝  | 炭疽病   | 0.48-0.6公斤  | 2000 | 雨季來臨時或發病初期施藥。<br>必要時隔7天施藥1次。   | 本藥劑試驗時，添加展著劑「強透力」4,000倍。<br>採收前9天停止施藥。                        |
| 桃   | 菌核病   |             | 1500 | 病害發生初期開始施藥。必要時隔10天施藥1次，最多3-4次。 | 採收前30天停止施藥。   |
| 桃   | 縮葉病   |             | 1500 | 萌芽前7天內施藥。必要時隔7-10天施藥1次，最多4-5次。 | 採收前30天停止施藥。   |
| 柑桔類 | 瘡痂病   |             | 1000 | 開花前施藥。                         | 落花後1星期至8月中旬每隔1個月施藥一次，如遇下雨，每隔1-2週施藥一次。                         |
| 柑桔類 | 黑星病   |             | 1000 | 病害發生初期開始施藥。                    | 落花後1星期至8月中旬每隔1個月施藥一次，如遇下雨，每隔1-2週施藥一次。                         |
| 柑桔類 | 黑點病   | 1公斤         | 3000 | 4-8月間每1個月1次。必要時隔30天施藥1次。       | 本劑試驗時加展著劑「來著通CS-7」3000倍。採收前30天停止施藥。                           |
| 茶   | 赤葉枯病  | 0.75-0.76公斤 | 2000 | 發病時剪枝後立即施藥，萌芽初期再施藥1次。          | 1.發病嚴重時應先剪除枝葉叢燒毀後施藥。2.應將藥劑噴施到葉背及葉叢內。採收前20天停止施藥。               |
| 茶   | 褐色圓星病 | 0.67公斤      | 1500 | 病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次，最多3-4次。  | 採收前20天停止施藥。   |

## 注意事項

1. 不可與鹼性藥劑、油類、硫黃混合使用。
2. 施用福得寶前後，不可施用夏油，以免藥害。