

克魔力[®] Kumulus[®]

清園專用

(可濕性硫黃) 80% 水分散性粒劑

產品特性

1. 固著性佳，耐雨性佳，不怕雨水沖刷。
2. 懸浮性佳，使用方便。



2公斤 鋁箔袋
25公斤原裝袋

對病原菌的作用機制

硫黃之殺菌作用為硫是親脂性物質能透過病原菌細胞膜進入菌體內取代呼吸作用的氧，使得菌體代謝作用發生異常，因此造成病原菌的死亡。

物理及化學性狀

本劑為灰褐色微細粒子，於空氣中會慢慢氧化成亞硫酸氣體，濕氣下生成硫酸。除白金之外金屬皆可直接起化合作用，不溶於水，易溶於二氧化碳中。

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
蔬菜	白粉病	1.0-1.2公斤	1000	病害發生初期開始施藥。必要時隔7天施藥1次。	高溫易生藥害，避免於盛花期使用。
果樹	白粉病	0.3-1.7公斤	1200	病害發生初期開始施藥。必要時隔10天施藥1次。	高溫易生藥害，避免於盛花期使用。
葡萄	白粉病	1公斤	1200	病害發生初期開始施藥。必要時隔10天施藥1次，最多3-4次。	採收前9天停止施藥。

使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
茭白筍	捲葉節蟻	2.5公斤	400	害蟻發生初期（茭白新葉往內捲曲時）開始施藥。必要時隔7天施藥1次，共2次。	高溫易生藥害，建議在傍晚時分施藥。 緊急防治用藥。
龍眼	銹蟎類		320		加用展著劑Total-wett或Citowett效果更佳。
荔枝	銹蟎類		320		
梨	梨瘤蚜		400	全園稼接前及接穗時施藥。	接穗前浸2分鐘。加展著劑Totalwett或Citowett效果更佳，梨全園稼接前以本藥劑徹底噴藥一次，以減少枝幹之蟲源。
柑桔類	銹蟎類		85		
茶	蟎蟎類		400		
茶	葉蟎類	2.5公斤	400	冬季	
茶	銹蟎類	2.5公斤	400	冬季	
茶	細蟎類	2.5公斤	400	冬季	

注意事項

1. 某些作物品種可能對無機硫黃類藥劑較敏感，使用時宜先小區域試驗。
2. 在溫熱帶氣候之下，無機硫黃類藥劑可能引起葉燒，因此，不宜於炎熱天候時單獨使用。
3. 作物於開花時期通常對藥劑較敏感，宜避免於此時期施藥。