

# 八將軍<sup>®</sup> Heat<sup>®</sup>

選擇性除草劑

(殺芬草) 70% 水分散性粒劑  
(長效型萌前除草劑)

## 產品特性

1. 用量低，且對環境影響小。
2. 可防治闊葉雜草。
3. 萌後噴施對闊葉雜草產生枯燒現象。
4. 可穿透葉片組織，作用迅速。
5. 具系統性，可上下移行。




產品規格：  
2.5公克 鋁箔袋  
30公克 鋁箔袋

## 對雜草的作用機制

殺芬草屬於吡啶雙酮之原紫質氧化酶抑制劑(PPO)，它能抑制植物體內葉綠體中葉綠素的生合成，使細胞液增加，胞液會和氧氣形成單一氧，脂質會進行過氧化反應，造成細胞質滲漏、組織壞疽直到植物死亡。

藥劑可經根、莖與葉吸收，一經吸收後可經由木質部進入植株內，部分經由韌皮部，在植株內藉由維管束系統移行至全株，進而造成植物死亡。



1. 藥劑滲透進入葉片後，透過篩管細胞之木質部與韌皮部運送至全株。



2. 藥劑透過維管束系統，迅速移行至全株，造成植物枯燒進而死亡。

## 使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
梨	雜草	0.072公升	稀釋至 600公升	園區闊葉雜草於開花前10-20公分高時，均勻噴施於雜草植株上，施藥一次。	1. 須注意避免噴及作物，以免發生藥害。2. 防除對象：咸豐草、野萵及鵝兒腸等闊葉雜草。
柑桔類	雜草	72公克	加水至 600公升	柑桔園田間闊葉雜草萌芽後10-20公分高時，施藥1次。	1. 避免噴及作物，以免發生藥害。2. 防除對象：大花咸豐草、野萵、馬齒莧、廣東草薺、野苘蒿、紫花藿香薊。
非耕作農地	雜草	72公克	每公頃 用水量 600公升	雜草萌芽後10-20公分高。將藥液均勻噴於雜草植株。	防除對象：苦蕒草、野萵、鰓腸、銀膠菊、龍葵、白花牽牛、馬齒莧。具萌前及萌後除草效果。
非耕作農地	雜草	36公克	每公頃 用水量 600公升	雜草萌芽後10-20公分高。將藥液均勻噴於雜草植株。	1. 與41%嘉磷塞異丙胺鹽溶液4公升，田間立即混合。2. 防除對象：苦蕒草、野萵、鰓腸、銀膠菊、龍葵、白花牽牛、小葉灰藿、馬齒莧。