

# 金斯統普<sup>®</sup> STOMP<sup>®</sup>

萌前除草劑

(施得圃) 38.7% 膠囊懸著劑

## 產品特性

1. 減少藥劑揮發，增強對天氣的忍受性。
2. 用藥量少，殘效較長，有效提高對雜草的防治能力。
3. 比較不會汙染施藥器具及施藥人員衣物。
4. 藥劑混合及使用較一般施得圃乳劑容易。
5. “水基”(water-based)產品，對大自然環境更具親和性。



產品規格：  
400毫升 膠瓶  
1000毫升 膠瓶  
2000毫升 膠瓶

## 對雜草的作用機制

金斯統普為一萌前及萌後初期使用之選擇性殺草劑，對旱田大多數一年生禾本科及闊葉雜草能有效防除，施藥後7-10天之內最好施以田間灌溉，或稍有雨水，保持土壤潮溼狀態，藥效更能發揮。

## 使用範圍

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
水稻	雜草	1.5公升	加水至600公升	於水稻移植後1-3天施藥1次。	防除移植本田雜草。防除對象：稗草、野茅、母草。
落花生	雜草	4.5-5.4公升	200-250	雜草萌芽前。	播種覆土後，雜草萌芽前全面噴於土面。
紅豆	雜草	4.5-5.4公升	200-250	播種覆土後，雜草萌芽前。	全面噴施於土壤表面。1.播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。2.防除對象：牛筋草、旱辣藤、龍葵、野萵、小葉灰薹、滿天星。
大豆	雜草	2公升	300		整地耙平後，將藥劑全面均勻噴於土壤表面，並與土壤混合後開始播種。限採收乾大豆者使用。

## 使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
大豆	雜草	2.63-3.94 公升	400	播種後。	整地播種後全面噴於土壤表面。限採收乾大豆者使用。
甘藍	雜草	1.67公升	600	定植前。	定植前一天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。土壤表面濕潤後施藥。
結球萵苣	雜草	1.25-1.67 公升	900-1200		播種後均勻噴施於畦面。1.施藥後土壤應保持濕潤狀態。2.防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。
結球白菜					
結球萵苣	雜草	1.67 公升	1200	定植前1天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。	1.土壤表面濕潤後施藥。2.防除對象：小葉灰薹、牛筋草、野萵、馬齒莧、珠仔草。
結球白菜					
蘿菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1200	播種後均勻噴施於畦面。	1.施藥後土壤應保持濕潤狀態。2.防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。
小白菜					
油菜					
青江菜					
芥藍					
芥菜					
茼蒿					
芹菜					
菠菜					
萵菜					
胡瓜					
苦瓜					
絲瓜					
扁蒲					
蒜	雜草	3.15公升	200	雜草萌芽後。	栽植後畦田禾本科雜草萌發至1-2葉時，將藥劑均勻全面噴施。施藥時田間應保持濕潤狀態。
韭	雜草	3公升	700	畦面雜草萌芽至1~2葉時將藥劑均勻全面噴施。	1.施藥後田間應保持濕潤狀態。2.防除對象：鵝兒腸、小葉灰薹、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧。
甘藷	雜草	1.5公升	400	播種後第一天。	均勻噴施於畦面1.防治對象：龍葵、小藜、馬齒莧、芒稷。2.適合秋作及塊根用品種。

### 使用範圍

作物	使用範圍	每公頃 每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
豆科小葉菜類、豆科根菜類、豆科豆菜類	雜草	2.5公升	稀釋至600公升	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。	施用時土壤需維持濕潤。
不結球萵苣與半結球萵苣	雜草	1.25-1.67公升	900-1200		播種後均勻噴施於畦面。1.施藥後土壤應保持濕潤狀態。2.防除對象：牛筋草、小葉灰薺、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。
蘿蔔	雜草	1.25-1.67公升	600	播種後。	播種後均勻噴射於畦面。
洋蔥	雜草	2公升	500	定植後。	定植後2-4天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝兩道。土壤表面濕潤後施藥。
金針	雜草	3.15公升	200	雜草萌發至1-2葉時均勻噴施。	施藥時田間應保持濕潤狀態。
番茄	雜草	2公升	300	雜草萌芽後。	定植第一次培土後俟雜草1-2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。避免噴及作物之生長點。
大豆	雜草	2.5公升	稀釋至600公升	播種覆土後。	全面噴濕於土壤表面。1.限毛豆園使用。施藥時田間應保持濕潤狀態。
菜豆	雜草	2.5公升	稀釋至600公升	播種覆土後，全面噴施於土壤表面。	1.施藥時田間應保持濕潤狀態。2.防除對象：通泉草、刺莧、龍葵、牛筋草、芒稈、野萵。
甜椒	雜草	2.14公升	700	定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。	1.避免噴及作物之生長點。2.防除對象：芒稈、牛筋草、小葉灰薺、馬齒莧、龍葵、野萵。
辣椒					
枸杞					
香瓜茄					
酸漿					
樹番茄					